



Jelec jesen

Leuciscus idus

Generační ryby

- Odlov z volných vod nebo rybníčního chovu v monokultuře nebo polykultuře s menšími druhy.
- Jikernačka – od 0,2 kg, GSI vytřených jiker zhruba 10-30 %, zvětšená břišní partie.
- Mlíčáci – třetí vyrážka, nad 0,2 kg a více.

Příprava generačních ryb

- Ryby umísťujeme do připravených žlabů 10-16 °C.
- Zakrytí nádrží (nebezpečí vyskočení), minimalizace stresu.

Stimulace k výtěru

- Anesteze – je nutná celková anesteze, hřebíčkový olej v dávce 3 ml/100 l vody.
- Kapří hypofýza – jikernačky, injekce do hřbetní svaloviny při 10-14 °C, jedna dávka 6 mg, úspěšnost 100 %, latentní stádium 520 °h.
- Relativní plodnost 20-80 tis. jiker/kg, v 1 g je 370 jiker.

Vlastní výtěr

- Ovulace se testuje u jikernačky každých 5 hodin po dobu 48 h.
- Při ovulaci okamžitý výtěr klasický do misky.
- Aktivace 100 g jiker + 1-5 ml spermatu + 100 ml vody, aktivace 2 minuty.
- Od 2 minuty, 1 min. mléko + odlepkování po dobu 29 minut talkem.

Inkubace a líhnutí

- Odlepkované jikry nasazujeme do třetiny Zugské lahve.
- Doba inkubace jiker 120-150 °d.
- Koupele - jodisol 5 ml/l na 2 minuty.
- Odstraňování mrtvých jiker.
- Vyčištěný váčkový plůdek se přenese do žlabů EWOS s kolíbkami o celkovém objemu 200 l vody, nebo kolíbkou podobné pro lína.

Odkrm váčkového plůdku

- Plůdek se rozplave za 3-5 dnů.
- Odkrm plůdku se provádí od 6-7 dne po vykulení plůdku, artemie až 12 dnů, s přechodem na suché krmivo po 12 dnech od rozplavání, např. startérové krmiva pro kaprovité ryby, při teplotě 20-22 °C, po 24 dnech vysazení plůdku o délce 1-2 cm do rybníků.
- Nebo po vykulení a nasazení do rybníčků, napustit týden před vysazením, 150 tis./ha – vířník, malé druhy perlooček, lovení na podzim 6-12 cm.