




Jelec proudník

Leuciscus leuciscus

Generační ryby

- Odlov z volných vod nebo z rybničního chovu, chov v polykultuře s menšími druhy.
- Jikernačka – od 0,07 kg, GSI vytřených jiker zhruba 10-20 %, zvětšená břišní partie.
- Mlíčáci – třetí vyrážka, nad 0,07 kg a více.

Příprava generačních ryb

- Ryby umisťujeme do připravených žlabů 8-11 °C.
- Zakrytí nádrží (nebezpečí vyskočení), minimalizace stresu.

Stimulace k výtěru

- Anesteze – anesteze, hřebíčkový olej v dávce 3 ml/100 l vody.
- Zvýšení teploty o 3-4 °C, tzn. 13-14 °C, výtěr nastává do 23-48 h.
- Relativní plodnost 50-100 tis. jiker/kg, v 1 g je 400 ks jiker, suché jikry 1,7 mm, nabobtnalé 2-2,5 mm.

Vlastní výtěr

- Ovulace se testuje u jikernačky každých 5 hodin v průběhu 48 h.
- Při ovulaci okamžitý výtěr klasický do misky, množství jiker od jikernačky 15-45 g.
- Aktivace 100 g jiker + 1-5 ml spermatu + 100 ml vody, aktivace 1 minuta.
- Od 1 minuty odlepkování, 1 minuta mléko polotučné + 29 minut talek 100 g/l.

Inkubace a líhnutí

- Odlepkované jikry nasazujeme do třetiny Zugské láhve.
- Doba inkubace jiker 120-160 denní stupňů.
- Jodisol – 2-5 ml/l, 2-5 minut.
- Odstraňování mrtvých jiker.
- Vyčištěný váčkový plůdek se přenese do žlabů EWOS s kolíbkami o celkovém objemu 200 l vody, nebo kolíbký podobné pro lína.

Odkrm váčkového plůdku

- Obdobně jako u jelce jesena.