



Okounek pstruhový

Micropterus salmonides

Příprava generačních ryb

- Chov generačních ryb do výtěru s dostatkem krmné ryby (střevlička východní), krmný koeficient 3,5; v malých rybnících, případně s obsádkou násady kapra, lovení v polovině května, těsně před nasazením k výtěru.
- Pohlavní dimorfismus – jikernačka světlejší barvy, zarudlá pohlavní papila, jikernačka je větší, zvětšená břišní partie, hmotnost 200 g.
- Mlíčáci menší, tmavší barvy, pouští sperma hmotnost 100 g.
- Převoz generačních ryb k výtěru s minimalizací stresu 50-60 kg na 2000 l.

Výtěr

- Anesteze – hřebíčkový olej při 20 °C – 3-4 ml/100 l vody.
- Řízený přirozený výtěr – v sádkách se šterkovým dnem, hloubka 0,3 -0,6 m, plocha 60-80 m², nasazuje se ihned po napuštění 6-10 párů o individuální hmotnosti 0,2-0,8 kg. K výtěru dochází při teplotě 16-20 °C v průběhu 14 dnů po vysazení. Generační ryby se odlovují v období vytváření hejn plůdku kolem jednotlivých hnízd v období kdy mlíčáci již nepečují o hnízda. Je nutné odlovit všechny generační ryby vzhledem k jejich kanibalismu.

Odchov plůdku

- V rybnících se okouněk odchovává obdobně jako candát.
- První část odchovu probíhá v sádkách s dostatkem vířníka, zhruba za týden se dodává do sádky živá potrava v podobě zooplanktonu.
- Výlov se provádí zhruba za 3-4 týdny od prvního výtěru ve velikosti 20 mm. Plůdek se odlovuje na plné vodě. Odchovává se v sádce zhruba 100-200 ks plůdku na m² a nasazuje do mělčích rybníčků o ploše do 0,5 ha s plným rozvojem zooplanktonu (napustit 2-3 týdny před vysazením).
- Zbylý plůdek se v sádce odchovává do velikosti 3-4 cm.